

Sturgeon ALLER BRONZE



Grower Feed



DECLARATION

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
Crude protein (%)	45	45	45	45
Crude fat (%)	15	15	15	15
NFE (%)	23,8	23,8	23,8	23,8
Ash (%)	6,9	6,9	6,9	6,9
Fibre (%)	3,3	3,3	3,3	3,3
P (%)	0,9	0,9	0,9	0,9
Gross energy (MJ)	21,2	21,2	21,2	21,2
Digestible energy (MJ)	17,6	17,6	17,6	17,6

COMPOSITION

Raw materials listed alphabetically. The full composition will appear on the label

blood products, farine de volaille, feather meal, fish meal, poultry oil, rapeseed, rapeseed oil, soya, sunflower protein conc., triticale, vitamins, minerals and premix, wheat.

RECOMMENDED FEEDING LEVELS

Kg feed per 100 kg fish per day

Fish (g)	MM	Water temperature (°C)								
		10	12	14	16	18	20	22	24	26
50-100	3	0,21	0,74	1,27	1,7	2,12	1,91	1,7	1,49	0,64
100-200	3	0,18	0,62	1,06	1,41	1,76	1,59	1,41	1,23	0,53
200-800	4.5	0,15	0,51	0,88	1,17	1,46	1,32	1,17	1,02	0,44
800-1500	4.5	0,12	0,42	0,73	0,97	1,21	1,09	0,97	0,85	0,36
1500-3000	6	0,1	0,35	0,6	0,81	1,01	0,91	0,81	0,71	0,3
3000-4000	6	0,08	0,29	0,5	0,67	0,84	0,75	0,67	0,59	0,25
4000-7000	8	0,07	0,24	0,42	0,56	0,69	0,62	0,56	0,49	0,21

ENVIRONMENTAL IMPACT WITH EXEMPLARY FEED CONVERSION RATIOS

Figures are per 100 kg fish production

	3 mm			4.5 mm			6 mm			8 mm		
Feed conversion	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
N in faeces (kg)	0,58	0,63	0,69	0,63	0,69	0,75	0,69	0,75	0,81	0,75	0,81	0,86
N in water (kg)	3,87	4,54	5,2	4,54	5,2	5,86	5,2	5,86	6,52	5,86	6,52	7,19
P in faeces (kg)	0,3	0,33	0,36	0,33	0,36	0,39	0,36	0,39	0,42	0,39	0,42	0,45
P in water (kg)	0,26	0,33	0,4	0,33	0,4	0,47	0,4	0,47	0,54	0,47	0,54	0,61